

**Profilm<sup>®</sup>****Fumigant en solution concentrée**

**Fumigant désinfectant de surface en phase vapeur qui se décompose lentement en dégageant du formaldéhyde. La méthode moderne de fumigation au formaldéhyde pour les bâtiments agricoles et avicoles, l'équipement et les véhicules utilisés pour l'élevage et la production de volailles.**

**GARANTIE :**

2-(Hydroxyméthyl)-2-Nitro- 1,3 Propanediol .....19,56 %  
Formaldéhyde .....2,28 %  
Alkyl (C<sub>8</sub> < 1 %, C<sub>10</sub> < 1 %, C<sub>12</sub>-67 %, C<sub>14</sub>-25 %, C<sub>16</sub>-7 %, C<sub>18</sub> < 1 %)  
Chlorure d'ammonium diméthyl benzyl .....3,09 %

DIN# 02245634

EPA Est. No. 61282-WI-1

**AVERTISSEMENT :**

**IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU**  
**ATTENTION : POISON SI INHALÉ**  
**RISQUE DE SENSIBILISATION DE LA PEAU**  
**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**  
**CONCENTRÉ DANGEREUX POUR LES HUMAINS**  
**ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES**

**AGRICOLE****LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION****INDICATIONS :**

Lors de la désinfection finale des bâtiments agricoles et avicoles, des véhicules et de l'équipement, la solution concentrée du désinfectant **Profilm** libère le formaldéhyde automatiquement et dans un délai précis. Peu ou pas d'odeur de formaldéhyde ne sera détectée.

**Profilm** s'est avéré efficace comme désinfectant par l'essai de dilution d'emploi de l'AOAC modifié pour les produits à pulvériser contre les organismes suivants. Toutes les dilutions (1:128) ont été testées à une dureté de l'eau de 400 mg/L (sous forme de carbonate de calcium) et avec une quantité de 5 % de sérum de bovin.

*Actinobacillus suis*  
*Bordetella bronchiseptica*  
*Campylobacter jejuni*  
*Clostridium perfringens*  
*Enterobacter aerogenes*  
*Escherichia coli*  
*Klebsiella pneumoniae*  
*Mycoplasma pneumoniae*

*Pasteurella multocida*  
*Proteus vulgaris*  
*Pseudomonas aeruginosa*  
*Salmonella choleraesuis*  
*Salmonella enteritidis*  
*Salmonella typhimurium*  
*Staphylococcus aureus*  
*Streptococcus pyogenes*

**Profilm** possède une efficacité viroicide démontrée lors de son utilisation sur des surfaces environnementales dures non poreuses et inanimées. Toutes les dilutions (1:128) ont été éprouvées à une dureté de l'eau de 400 mg/L (sous forme de carbonate de calcium) et avec une quantité de 5 % de sérum de bovin.

Bronchite infectieuse  
Fièvre aphteuse  
Gastro-entérite transmissible  
Influenza aviaire

Laryngotrachéite aviaire  
Maladie de Newcastle  
Pseudorage  
Influenza porcine

SDRP (syndrome dysgénésique respiratoire porcin)

**Profilm** possède une efficacité fongicide démontrée selon l'essai de dilution d'emploi de l'AOAC modifié pour les produits à pulvériser. Toutes les dilutions (1:128) ont été éprouvées à une dureté de l'eau de 400 mg/L (sous forme de carbonate de calcium) et avec une quantité de 5 % de sérum de bovin.

Candida albicans Trichophyton mentagrophytes

**MODE D'EMPLOI :**

Diluer avec de l'eau froide tel qu'indiqué ci-dessous et pulvériser à l'aide du dispositif mécanique. Laisser sécher à l'air après s'être assuré d'un contact pendant au moins 10 minutes. Un contact d'au moins 60 minutes est recommandé pour la désinfection du virus de la fièvre aphteuse.

	Dilution d'emploi	<b>Profilm</b>	Eau Froide
Désinfection Finale	1 :128	40 mL	5 litres

**Bâtiments agricoles, véhicules, etc. :**

Les animaux doivent être évacués des bâtiments et des véhicules. Enlever les saletés et le fumier des planchers, des murs et des surfaces des granges, des enclos, des stables, des couloirs et des autres installations. Avant la désinfection, nettoyer toutes les surfaces en utilisant un détergent germicide (par exemple, Proquat) et rincer avec de l'eau. Mouiller abondamment toutes les surfaces avec la solution **Profilm**. Aérer les bâtiments et les autres milieux clos et laisser sécher complètement avant d'y abriter les animaux. Rincer abondamment les mangeoires et les abreuvoirs avec de l'eau potable avant de les réutiliser.

**Pulvérisation :**

**Profilm** peut être appliqué par pulvérisation comme produit d'appoint aux procédures régulières de nettoyage et de désinfection. Appliquer **Profilm** à une dilution de 1% (1:100 ou 50 mL **Profilm** dans 5L d'eau) à 2% (1:50 ou 100 mL **Profilm** dans 5L d'eau) sous forme de vapeur (embrun de pulvérisation humide) soit avant ou après les procédures de nettoyage et de désinfection régulières. Pulvériser jusqu'à ce que la zone soit humide à l'aide d'un brumisateur automatique selon les directives du fabricant. Aérer les bâtiments et les autres endroits clos et permettre au traitement de sécher avant de réintroduire le bétail dans les bâtiments. Rincer les mangeoires et les abreuvoirs avec de l'eau potable avant de les réutiliser.

**Équipement pour le bétail :**

Vider tous les équipements servant à l'alimentation et à l'irrigation. Avant la désinfection, nettoyer tous les équipements en utilisant un détergent germicide tel qu'indiqué précédemment et rincer avec de l'eau. Mouiller abondamment toutes les parties de l'équipement avec la solution **Profilm**. Immerger les licous, les cordes, les fourches, les pelles et les grattoirs ainsi que tous les autres types d'équipement. Ne pas vaporiser sur les aliments destinés aux animaux et aux oiseaux. Rincer abondamment les mangeoires et les abreuvoirs avec de l'eau potable avant de les réutiliser.

**PRÉCAUTIONS**

Nocif si ingéré, inhalé ou si le produit pénètre dans la peau. Irritant pour les yeux et la peau. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter des lunettes ou un écran facial. Utiliser dans des endroits bien aérés. Lorsqu'une opération demande un contact avec des vapeurs à concentration élevée, utiliser un appareil de protection respiratoire homologué contre le formaldéhyde. Les utilisateurs doivent porter des gants de caoutchouc de protection contre les agents chimiques, une chemise à manches longues, un pantalon, des souliers et des bas. Se laver soigneusement avec du savon et de l'eau après avoir manipulé le produit. Retirer tous les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Un contact cutané prolongé ou fréquent peut causer des réactions allergiques. Ne pas utiliser sur les animaux.

**PREMIERS SOINS**

En cas d'ingestion, faire vomir. Ne jamais faire prendre quelque chose par la bouche à une personne sans connaissance. Appeler un médecin. Si le produit entre en contact avec les yeux, laver à grande eau. Si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau. En cas d'inhalation, permettre l'accès à un endroit où il y a de l'air frais. Si la personne affectée ne respire plus, donner la respiration artificielle. Dans tous ces cas, avoir recours à des soins médicaux. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**INFORMATION TOXICOLOGIQUE**

Des lésions probables des muqueuses peuvent causer des nausées, des vomissements et occasionnellement de la diarrhée. Des mesures contre des traumatismes circulatoires et même de l'oxygène et des mesures manuelles ou mécaniques pour maintenir la fonction respiratoire peuvent être nécessaires. Des vapeurs peuvent causer de l'irritation aux muqueuses, une hypersensibilité de contact, de la dyspnée, des maux de tête, des nausées, de l'acidose et des palpitations. Une ingestion peut causer un état de choc, des troubles de la miction, de l'hématurie, de l'anurie, des vertiges, des convulsions, une dépression du système nerveux central ou une défaillance respiratoire.

DL50 (rat) : 8 000 mg / kg.

Contient aussi du méthanol 0,68 %.

**ENTREPOSAGE****TENIR DEBOUT PENDANT LE TRANSPORT ET L'ENTREPOSAGE.**

Les contenants de 208 litres, 9,5 litres et de 3,8 litres sont munis d'un couvercle de décompression. **CRAINT LE GEL**. Entreposer dans le contenant original, de manière sûre. Éviter d'entreposer dans des conditions qui pourraient altérer le contenant ou sa capacité de fonctionner adéquatement. Éviter d'entreposer en hauteur dans des conditions qui pourraient affecter la résistance de l'emballage. Ouvrir le contenant dans un espace bien aéré et éviter de respirer les vapeurs. Garder le contenant fermé hermétiquement lorsque non utilisé.

**MISE AU REBUT**

1. Ne pas réutiliser le contenant.
2. Rincer le contenant vide abondamment et ajouter le liquide de rinçage à la dilution qui servira à la désinfection du site.
3. Suivre les directives provinciales dans le cas où des exigences supplémentaires seraient requises concernant nettoyage du contenant avant de le jeter ou de le recycler.
4. Éliminer le contenant selon les exigences provinciales.
5. Pour obtenir de l'information sur la façon de se débarrasser d'un produit inutilisé ou non désiré et sur le nettoyage en cas de déversement, communiquer avec le bureau régional d'Environnement Canada.
6. Dans le cas de légers déversements, récupérer le liquide libéré. Absorber le reste avec un absorbant solide comme de l'argile. Balayer le déversement et le mettre dans le contenant d'élimination puis l'éliminer tel que décrit au point 5.

**NE PAS VIDANGER DANS LES COURS D'EAU DE SURFACE.****AVISER ENVIRONNEMENT CANADA TEL QUE RECOMMANDÉ AU POINT 5.****AVIS À L'UTILISATEUR**

Ce produit doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette.

**AVIS À L'ACHETEUR**

La garantie accordée par le vendeur se limite aux conditions énoncées sur l'étiquette et, sous cette réserve, l'acheteur assume les risques corporels ou matériels découlant de l'utilisation ou de la manipulation du produit, et accepte celui-ci à cette condition.

Pour plus d'information, consultez la fiche signalétique.

Medical **1-800-498-5743**

**[?] 1-800-621-8829**

Manufactured By:  
Hacco, Inc.  
110 Hopkins Drive  
Randolph, WI 53956

Code (NR.NA) NL.NI

**SPECIMEN LABEL**

---

Item No.: 142165  
Net Contents: 3.8 L  
UPC: n/a  
Format: n/a

Item No.: 142175  
Net Contents: 9.5 L  
UPC: n/a  
Format: n/a

Item No.: 142185  
Net Contents: 208 L  
UPC: n/a  
Format: n/a

Marque déposée de Pharmacia & Upjohn Company  
Utilisée sous licence par Pfizer Canada Inc. : Profilm