

BURROW OAT BAIT®

GRANULÉ

Ce produit ne doit être utilisé que par des manipulateurs de produits antiparasitaires certifiés, des agriculteurs et des personnes autorisées en vertu de programmes de lutte antiparasitaire approuvés par le gouvernement.

GARANTIE:

Phosphore de zinc2%

N° D'HOMOLOGATION 24795

EPA Est. No. 61282-WI-1

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES


LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI**AVERTISSEMENT**

AVERTISSEMENT, contient l'allergène Soja

COMMERCIAL**POISON****MODE D'EMPLOI**

GAUFRES GRIS (*Thomomys talpoides*) et **SPERMOPHILES** (*de Richardson, du colombia, rayé, de Franklin, etc.*) (*Spermophilus* spp.). **BURROW OAT BAIT** peut être utilisé dans le cadre d'un programme de lutte et peut être distribué avec un creuse-terrier. Sa distribution peut se faire au printemps, en été et en automne. Pour de meilleurs résultats, le distribuer avant ou après la croissance de la végétation. Pour connaître les meilleurs moyens de lutte dans la région, consulter le spécialiste provincial de la lutte contre les ravageurs vertébrés. **BURROW OAT BAIT** peut être utilisé pour la protection des champs de luzerne, des pâturages, des parcours, des terrains de golf et des parcs ainsi que des endroits non cultivés comme les rangs d'arbres nouvellement plantés, les bords de routes et les lignes enfouies.

GAUFRES – APPÂTAGE AVEC UN CREUSE-TERRIER : Employer un creuse-terrier tel que le WESTERN ALFALFA ou le GOFER. Creuser un terrier d'une profondeur de 20 à 40 cm. Le creuse-terrier distribue l'appât dans les galeries artificielles qui interceptent les galeries des gaufres. Utiliser **BURROW OAT BAIT** à la dose de 3,3 kg/ha. Le distribuer en damier, à tous les 7,5m, partout dans la zone infestée. Après sa distribution, niveler les buttes, avec une herse ou un outil similaire, pour un faciliter la vérification. Vérifier l'efficacité du traitement 10 jours après la distribution en comptant les buttes en activité. S'il en reste, les retraiter, avec une sonde manuelle ou un creuse-terrier, pour maximiser l'efficacité du traitement. Répéter le traitement au besoin. Un traitement au pourtour du champ peut empêcher une réinfestation.

DISTRIBUTION EN DAMIER AVEC UN CREUSE-TERRIER

GAUFRES – APPÂTAGE MANUEL: Ouvrir le terrier, mettre une cuillerée à thé rase dans chaque butte en activité et fermer le terrier. Après 10 jours, vérifier s'il y a des buttes en activité. S'il en reste, les retraiter.

SPERMOPHILES – APPÂTAGE MANUEL : Pré-appâtage : Pour de meilleurs résultats, mettre 15 g de préappât non traité (de l'avoine entière ou un préappât commercial non traité), à une distance de 15 à 20 cm du trou, 7 jours avant de distribuer **BURROW OAT BAIT**. Appâtage : Mettre de **BURROW OAT BAIT** à une distance de 15 à 20 cm du trou. En utiliser 15 g par trou sur le sommet de la butte. N'en distribuer qu'en l'absence de pluie ou de neige 48 heures avant ou après. En distribuer au printemps, avant la croissance de la végétation verte. On peut aussi en distribuer au début de juillet, les spermophiles commençant alors à se nourrir de graines plutôt que de végétation, ou en automne, après la disparition de la végétation verte.

RESTRICTIONS D'UTILISATION

L'appât DOIT être placé dans un point d'appât inviolable ou dans un endroit auquel les enfants, les animaux de compagnie et les animaux d'élevage ne peuvent avoir accès. Afin d'assurer un usage sans danger du produit, les points d'appât inviolables doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- le point d'appât doit être fabriqué d'un matériau hautement résistant (p. ex. métal ou plastique moulé par injection) qui ne peut être détruit par les enfants ou les animaux non ciblés;
- son ouverture doit être conçue de manière à ce qu'il soit impossible pour les enfants et les animaux non ciblés d'atteindre l'appât;
- la structure interne doit empêcher l'appât de tomber, si le point d'appât est secoué;
- le panneau donnant accès à l'intérieur doit se fermer solidement et se verrouiller (p. ex. vis en métal ou cadenas);
- le point d'appât doit pouvoir être fixé solidement à une surface (p. ex., être cloué);
- le point d'appât doit être clairement étiqueté : **ATTENTION POISON**

RESTRICTIONS D'UTILISATION

Appliquer seulement dans les terriers occupés par des spermophiles. NE PAS appliquer dans des terriers inoccupés. Les manipulateurs de phosphure de zinc doivent observer l'aire de traitement proposée avant de procéder au traitement, afin de confirmer l'activité des spermophiles et de s'assurer qu'aucun signe ne témoigne de l'activité d'espèces en péril ou de leur présence dans les terriers. Pour tout renseignement sur les espèces en péril dans votre région, veuillez communiquer avec votre agent provincial ou fédéral de protection de la faune.

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS, DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE. Se laver les mains avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de fumer ou d'aller aux toilettes. Laver la peau à fond avec de l'eau et de savon après avoir manipulé le produit. Laver les vêtements contaminés séparément du reste de la lessive, au savon et à l'eau chaude, avant de les porter de nouveau. Si le pesticide pénètre sous les vêtements, les retirer immédiatement, se laver la peau à fond et enfiler des vêtements propres. Porter des gants résistant aux produits chimiques durant l'élimination des rongeurs morts, des appâts non consommés et des contenants vides.

Toutes les personnes qui manipulent, chargent ou appliquent ce produit doivent porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussures et des chaussettes ainsi que des gants résistant aux produits chimiques. De plus, les personnes qui procèdent au chargement des pastilles ou des appâts dans l'équipement d'application au sol, ou au chargement et à l'application du produit à l'aide d'équipement manuel, doivent porter un masque antipoussière approuvé par le NIOSH et des lunettes de protection.

Peut être mortel s'il est avalé. Éviter tout contact avec la peau. Porter des gants de caoutchouc pour manipuler l'appât. Ne pas respirer sa poussière ni ses émanations. Ne jamais contaminer les aliments destinés à l'alimentation humaine ou animale. Garder les enfants, les animaux familiers et les bêtes domestiques à l'écart des endroits traités et surtout des stations d'appât. Ne pas laisser le produit en tas non protégés. NE PAS APPLIQUER DU HAUT DES AIRES.

PREMIERS SOINS

Signaler immédiatement à un médecin ou à un centre antipoison tout cas d'ingestion par des humains. Communiquer immédiatement avec un vétérinaire en cas de présumé intoxication d'un animal de compagnie ou d'élevage.

En cas d'ingestion, faire vomir la personne en lui touchant le fond de la gorge du bout du doigt. Ne rien administrer par la bouche si la personne est inconsciente ou n'est pas alerte. Contacter immédiatement un médecin ou un centre antipoison. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer

l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Les personnes qui appliquent du phosphure de zinc et qui présentent des signes et des symptômes d'intoxication, comme des nausées, des douleurs abdominales, une oppression thoracique ou de la faiblesse, doivent se faire examiner immédiatement par le médecin. Les huiles sont à éviter. Il n'existe pas d'antidote spécifique. En cas d'ingestion, un lavage gastrique très méticuleux est généralement indiqué. Un lavage au bicarbonate de sodium à la concentration de 3% à 5% a été suggéré. La contamination secondaire par le lavage est à éviter. Prescrire un traitement symptomatique de soutien.

ENTREPOSAGE

Conservé dans un endroit frais et sec, à l'écart des autres produits chimiques et des aliments destinés à l'alimentation humaine ou animale. Ranger le produit non utilisé dans son contenant d'origine, dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants et des animaux non cibles.

ÉLIMINATION

Ne pas réutiliser le contenant vide. Jeter les appâts non utilisés ou avariés conformément aux exigences locales. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale. Rendre le contenant inutilisable. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

ÉLIMINATION DES RONGEURS: Jeter les rongeurs morts avec les ordures ou les enterrer.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

Medical 1-800-498-5743

[?] 1-800-621-8829

Manufactured By:
HACCO, Inc.
110 Hopkins Drive
Randolph, WI 53956

Public Enquires (Pas-Médical):
United Agri Products Canada, Inc.
789 Donnybrook Drive
Dorchester, Ontario N0L 1G5
1-800-265-4624

SPECIMEN LABEL

Code (NL.NI.) NO.NI.

Item No.: 1241280

Net Contents: 5 kg

UPC: 0100623111003090

Format: g-UCC/EAN-128 with CC-C Composite

Item No.: 1241280

Net Contents: 4 x 5 kg

UPC: 0150623111003095

Format: g-UCC/EAN-128 with CC-C Composite

Item No.: 115163

Net Contents: 20 kg

UPC: 0100623111002772

Format: g-UCC/EAN-128 with CC-C Composite